

## CellPet FTを用いたF-PDOの小片化/抗がん剤評価

細胞種：RLUN7-2 (F-PDO; 福島県立医科大学医療-産業トランスレーショナルリサーチセンター)  
HP： <https://www.fmu.ac.jp/home/trc/provision/f-pdo/> を参照


RLUN7-2 (CTR#30040)				
小片化条件	なし	CellPet FT	CellPet FT handy	
培地	MammoCult			
フィルターサイズ	-	70	70	
希釈倍率	10			
化合物数	8			
処理時間(h)	144			
CV値	0時間	23.5%	19.5%	20.6%
	培養後	5.2%	5.8%	3.4%
細胞増殖	溶媒	1.96	1.52	1.72
	無処理	1.37	2.11	1.93

使用抗がん剤

- ・ Mitomycin C
- ・ Paclitaxel
- ・ Afatinib
- ・ Lapatinib
- ・ Erlotinib
- ・ Gefitinib
- ・ Osimertinib
- ・ Rociletinib


### 処理直後

70 μmのメッシュフィルターを使用




小片化処理後は無処理より細かくなった。FTとHandyで、細胞塊のサイズに差はなかった。

### 培養3日




細胞量は全て同程度だった。

## 培養9日




細胞量は全て同程度、細胞塊のサイズもほとんど差がなかった。

## 培養13日




増殖速度は無処理、FT、FT handyで差はなかった。細胞の見た目も無処理と差はなかった。

### Mitomycin C



### Paclitaxel



使用した8種類の抗がん剤(代表上記2例)において、小片化条件の違いによるIC<sub>50</sub>値の差はなかった。